



*Informativo Técnico*

# CIPROHEPTADINA HCl

## *ANTI-HISTAMÍNICO*

### **Mecanismo de ação**

Utilizado no tratamento de alergias, age competindo com a histamina pelos receptores H1 presente nas células diminuindo desta maneira sua ação.

### **Propriedades**

É bem absorvida por via oral ou parenteral com duração de ação de até 8 horas. É metabolizada no fígado e seus metabólitos são excretados pela urina.

### **Indicações**

Pode ser usada em três tipos de tratamento. Como Antialérgico e Antipruriginoso a faixa de dosagem é de 4 a 12mg/dia. Como antiemético, na dosagem de 4 a 20mg/dia. E como orexígeno e anabolizante, na dose de 4 a 12mg/dia.

### **Contra-indicações**

Pacientes com problemas renais, asma aguda, glaucoma, gravidez e lactação.

### **Dose**

De 4 a 20mg ao dia. A dose deve ser individualizada e não deve exceder 0.5mg/kg ao dia.

Crianças de 7 a 14 anos - 4mg 2 a 3 x ao dia, sendo no máximo 16 mg diariamente.

Obs: A matéria prima apresenta-se na forma de sal sesquihidratado, portanto tem Fator de equivalência de 1,08 pelo Manual da ANFARMAG.

### **Nota**

No período do tratamento não deve ser ingerido bebida alcoólica ou qualquer outro depressor do SNC. Pode interagir potencializando efeito de drogas depressoras do SNC, aumentam efeito de antimuscarínicos com associações com drogas como haloperidol, fenotiazinas e outras. Não se indica uso com inibidores da MAO.



### Sugestões de formulação

<b>Estimulante de apetite</b>	
Ciproheptadina HCl	2mg
Excipiente qsp	1 cáps
Xarope qsp	5ml

Posologia – 0,25mg/kg de peso ao dia, em 3 tomadas.

<b>Estimulante de apetite e anabolizante</b>	
Ciproheptadina HCl	4mg
Dicloridrato de Buclisina	30mg
Cobamamida	1mg
Vitamina C qsp	300mg

Posologia – 1 cáps 2 vezes ao dia, entre as refeições.

<b>Estimulante de apetite e polivitamínico</b>	
Ciproheptadina HCl	2mg
Ac. Glutâmico	50mg
Glicerofosfato de Calcio	200mg
Vitamina B1	2,5mg
Vitamina B2	1mg
Vitamina B6	5mg
Vitamina B12	20mcg
Nicotinamida	10mg
Pantotenato de Calcio	10mg
Xarope Aromatizado qsp	5ml

Posologia – 1 colher de chá 1 vez ao dia entre as refeições

<b>Anti-alérgico</b>	
Ciproheptadina HCl	2mg
Dexametasona	0,25mg
Xarope simples qsp	5ml



pharmanostra

Posologia – Crianças de 7 a 14 anos tomar 1 colher de café (2,5ml) 3 X/dia.

Adultos tomar 1 colher de chá (5ml) 3 X/dia.

### **Referências Bibliográficas**

1. Batistuzzo, J. A. O. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo: Tecnopress, 2002.
2. DEF -DICIONÁRIO DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS. Edição 2004/05. Rio de Janeiro: Editora de Publicações Científicas Ltda, 2004.